
유황 농법 "무화과" 관리 매뉴얼



구분	분류		내용
유황농법	병해충 관리	토양살포 관주	수목자체 방어능력 및 면역력 극대화 **"바오밥 3000, 5000, 4000"**
			수액에 유황성분 함유로 병해충에 대한 직접방제 **"바오밥 3000, 5000, 4000"** -선충, 총채, 역병 등-
		엽면살포	전 생육기간 (7~10일간격) **"바오밥 7500" 살포 - 관련 합제** 또는 **관련 농약** (임의 저감사용**) 혼합 사용-**
	시비 관리		기비 및 추비 : 바오밥 **5000**, 관주(수) : **"바오밥 4000"** (15~20일 간격), 필요시 바오밥 6000 (10~15일 간격 엽면 or 관주)
휴면기	시비 관리	기비	유기질 비료 표준 시비량의 50% + **"바오밥 5000"** 나무주변 토양 살포 (삭제면적 기준 : 1포/100평기준)
		추비	**"바오밥 5000" 나무주변 토양 살포 (식제면적 기준 : 1포/100평기준)**
개화기	병해충 위험기		낙화, 수정 결실기에 특정 병해충 위험기가 집중됨, (강우전 예방, 강우후 방제 개념의 집중방제 실시)
			발아(개화)전 1회 이상 낙화 70~80% 싯점 **"바오밥 7500"** 엽면 (1병 500ℓ 희석 임의량) - 결실후 1회이상 과실위주 "바오밥 7500" 살포 -
			발아기(개화) 1회 이상 **"바오밥4000"** 관주(수) (500배희석 임의량 or 6~700평/1병 1.8ℓ)
성장기	재배 관리		초세를 강하게 유지하고 정지 시행이 생육조건에 좋음, **"바오밥 6000"** 엽면 (1회/월 권장. 500배희석 임의량 or 5~600평/1병)
	시비 관리		수세를 왕성하게 유지하여 건전생육을 유도하므로 활발한 광합성을 유지하여 과실비대, 색상관리에좋음
			생리장해 해소, 생육, 착과관리 **"바오밥 4000"** 2회/월 관주(수) (500배희석 임의량 or 6~700평/1병 1.8ℓ)
	병해충 관리		**"바오밥 7500"** 7~10일간격 엽면 (500배희석 임의량 or 7~800평/1병)
성숙 수확기	일반 관리	물 관리	작물특성에 맞춰서 적정한 수분 공급을 위한 관수 시행
		생육 관리	성숙조건에 알맞은 초세를 유지하고 질소질 비료의 과잉 공급에 유의한다
	시비 관리		**"바오밥 6000"** 관수 (1병 1000ℓ 희석-1000배) -비대촉진-
			생리장해 해소, 생육, 착과관리를 위하여 **"바오밥 4000" 혼합** 관수시행 (1병 2000ℓ 희석(**1000배**)
	병해충 관리		7~10일간격 **"바오밥 7500"** 엽면살포 (500배희석 임의량 or 7~800평/1병)