
유황 농법 "아로니아" 관리 매뉴얼

1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12		
상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하
 바오밥7500 병해충 관리제									발아 전엽			성장기																					낙엽, 휴면기		
						밑거름						개화 착과기			유과기			비대,착색, 성숙기						수확												
									관수						웃거름			관수									웃거름									
															갈반병			갈반병, 부패병																		
									진딧물,나방애벌레			진딧물,나방애벌레,노린재						여치, 노린재, 응애, 조류																			

갈반병	갈색반점을 보이는 모든병의 총칭, 감염:신초초기, 발병: 장마직후(7,8월)~10월말까지 주기적 발병(탄저, 갈색무늬등)
낙엽병 줄기바름병	질소과잉, 습도, 배수불량 환경에서 발생



(주)코코스토리

구분	분류		내용
유황농법	병해충 관리	토양살포 관주	수목자체 방어능력 및 면역력 극대화 **"바오밥 3000, 5000, 4000"**
			수액에 유황성분 함유로 병해충에 대한 직접방제 **"바오밥 3000, 5000, 4000"** -선충, 총채, 역병 등-
		엽면살포	전 생육기간 (7~10일간격) **"바오밥 7500" 살포** - **관련 합제** 또는 **관련 농약** (임의 저감사용**) 혼합 사용**-
	시비 관리		기비 및 추비 : 바오밥 **5000**, 관주(수) : **"바오밥 4000"** (15~20일 간격), 필요시 바오밥 6000 (10~15일 간격 엽면 or 관주)
휴면기	시비 관리	기비	유기질 비료 표준 시비량의 50% + **"바오밥 5000"** 나무주변 토양 살포 (삭제면적 기준 : 1포/100평기준)
		추비	**"바오밥 5000" 나무주변 토양 살포 (식제면적 기준 : 1포/100평기준)**
개화기	병해충 위험기		낙화, 수정 결실기에 특정 병해충 위험기가 집중됨, (강우전 예방, 강우후 방제 개념의 집중방제 실시)
			발아(개화)전 1회 이상 낙화 70~80% 싯점 **"바오밥 7500"** 엽면 (1병 500ℓ 희석 임의량) - 결실후 1회이상 과실위주 "바오밥 7500" 살포 -
			발아기(개화) 1회 이상 **"바오밥4000"** 관주(수) (500배희석 임의량 or 6~700평/1병 1.8ℓ)
성장기	재배 관리		초세를 강하게 유지하고 정지 시행이 생육조건에 좋음, **"바오밥 6000"** 엽면 (1회/월 권장. 500배희석 임의량 or 5~600평/1병)
	시비 관리		수세를 왕성하게 유지하여 건전생육을 유도하므로 활발한 광합성을 유지하여 과실비대, 색상관리에좋음
			생리장해 해소, 생육, 착과관리 **"바오밥 4000"** 2회/월 관주(수) (500배희석 임의량 or 6~700평/1병 1.8ℓ)
	병해충 관리		**"바오밥 7500"** 7~10일간격 엽면 (500배희석 임의량 or 7~800평/1병)
성숙 수확기	일반 관리	물 관리	작물특성에 맞춰서 적정한 수분 공급을 위한 관수 시행
		생육 관리	성숙조건에 알맞은 초세를 유지하고 질소질 비료의 과잉 공급에 유의한다
	시비 관리		**"바오밥 6000"** 관수 (1병 1000ℓ 희석-1000배) -비대촉진-
			생리장해 해소, 생육, 착과관리를 위하여 **"바오밥 4000" 혼합** 관수시행 (1병 2000ℓ 희석(**1000배**)
	병해충 관리		7~10일간격 **"바오밥 7500"** 엽면살포 (500배희석 임의량 or 7~800평/1병)